

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

**CARGO****M****ÉDICO PSQUIATRA****13-01-2018**

Esta prova consta de 20 (vinte) questões sobre Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.

**ATENÇÃO**

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
  1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
  2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**BOA PROVA!****Nº DE INSCRIÇÃO****NOME**

1. Os transtornos relacionados ao uso do álcool apresentam como doenças comórbidas, mais frequentes, as seguintes patologias, exceto a da alternativa:  
A. ( ) Personalidade antissocial  
B. ( ) Esquizofrenia  
C. ( ) Transtornos de humor  
D. ( ) Transtornos de ansiedade
2. Caracteriza-se por problemas de memória e esquecimento e se divide nas três subcategorias, descritas a seguir: 1. Causado por condição médica (hipóxia); 2. Produzido por toxinas ou medicamentos, como maconha, diazepam; e 3. Sem outra especificação, o item da alternativa:  
A. ( ) Delirium  
B. ( ) Demência  
C. ( ) Transtorno Amnésico  
D. ( ) Pseudo Demência
3. Em relação à Esquizofrenia, marque a alternativa errada.  
A. ( ) Nos EUA a prevalência para a vida toda é de 1%.  
B. ( ) As idades de pico de início são 10 e 25 anos para mulher e 25 e 35 anos para homem.  
C. ( ) O suicídio é uma das causas principais de mortalidade entre os esquizofrênicos.  
D. ( ) Mais de 75% dos esquizofrênicos fumam.
4. Marque a alternativa correta em relação às manifestações clínicas de transtorno bipolar II.  
A. ( ) É uma doença crônica, que se caracteriza por humor depressivo que dura a maior parte do dia e de forma quase contínua.  
B. ( ) Um conjunto completo de sintomas de mania ocorre durante o curso desse transtorno.  
C. ( ) Esse transtorno é caracterizado por episódios de hipomania e depressão menor.  
D. ( ) Manifestações do transtorno depressivo maior, combinadas com as de um episódio hipomaníaco.
5. Há cerca de 3 meses, JFC, 42 anos, masculino, casado, carpinteiro, após a morte de um vizinho, começou a ter dificuldade de trabalhar. Deveria pegar um barco para ir a Itaparica, porém se sentia muito ansioso dentro do barco. Tinha medo de passar mal e não poder receber socorro médico. Cada vez que entrava no barco tinha sudorese profusa, taquicardia e muito medo de morrer ou que algo ruim lhe acontecesse e não pudesse ser atendido. Tinha os mesmos sintomas no supermercado, no shopping e em locais de festas populares. Deixou de trabalhar fora, passando a realizar os seus trabalhos apenas em casa. Parou de frequentar ambientes com aglomerações.  
Marque o diagnóstico correto em relação ao caso clínico descrito acima.  
A. ( ) Transtorno de Pânico  
B. ( ) Agorafobia  
C. ( ) Transtorno de Ansiedade Generalizada  
D. ( ) Fobia Social
6. Paciente feminino, 19 anos, estudante fez duas vezes vestibular para Direito, porém não conseguia concluir as provas. Quando ia assinar a lista de presença, sua mão tremia e ela se sentia muito desconfortável, pois notava que o fiscal a observava. Tinha diarreia, saía várias vezes para ir ao banheiro, chegava a sentir náuseas e até a vomitar. Seu coração batia mais forte e ela não conseguia concatenar as ideias para responder às questões das provas.  
A. ( ) Transtorno de Pânico  
B. ( ) Agorafobia  
C. ( ) Transtorno de Ansiedade Generalizada  
D. ( ) Fobia Social

7. Em relação ao Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) marque a resposta errada.
- A.( ) No TOC, os efeitos iniciais dos antidepressivos costumam ser vistos após 2-4 semanas de tratamento, apesar de 4-6 semanas, normalmente, serem necessárias para a obtenção do benefício máximo terapêutico.
  - B.( ) A potência da recaptação de serotonina da clomipramina é excedida apenas pela sertralina e pela paroxetina.
  - C.( ) Nos poucos estudos comparativos realizados, a terapia comportamental mostrou-se tão efetiva quanto as farmacoterapias no TOC.
  - D.( ) Analistas e psiquiatras orientados dinamicamente verificaram melhoras sintomáticas em pacientes com TOC, no curso da análise ou da psicoterapia de insight prolongado.
8. O medicamento clozapina apresenta as seguintes contraindicações, exceto a da alternativa:
- A.( ) Epilepsia
  - B.( ) Leucócitos < 3500/mm<sup>3</sup> e/ou neutrófilos < 2000/mm<sup>3</sup>
  - C.( ) Depressão do SNC ou estados comatosos de qualquer natureza
  - D.( ) Íleo paralítico
9. Entre as estratégias abaixo, marque a que não potencializa a ação de antidepressivos no tratamento da depressão.
- A.( ) Adição de carbonato de lítio
  - B.( ) Adição de benzodiazepínico
  - C.( ) Adição de T3
  - D.( ) Adição de antipsicóticos atípicos
10. No transtorno bipolar é considerado monoterapia, de primeira linha, para tratamento de episódio agudo depressivo, as seguintes medicações, exceto a da alternativa:
- A.( ) Lítio
  - B.( ) Lamotrigina
  - C.( ) Quetiapina
  - D.( ) Aripiprazol
11. A Esquizofrenia Paranoide é o tipo de esquizofrenia mais comum em muitas partes do mundo. Qual dos sintomas abaixo é considerado comum nesse tipo de esquizofrenia?
- A.( ) Alucinações de sensações sexuais
  - B.( ) Excitação
  - C.( ) Postura inadequada
  - D.( ) Flexibilidade cérea
12. Qual a alternativa incorreta no que se refere ao tratamento e reabilitação da Cocaína?
- A.( ) A síndrome de abstinência não apresenta alterações fisiológicas que requeiram tratamento em contexto de internação hospitalar.
  - B.( ) Nenhum agente farmacológico reduz de forma confiável a intensidade da síndrome de abstinência.
  - C.( ) A maioria dos usuários de cocaína submete-se voluntariamente ao tratamento.
  - D.( ) O maior obstáculo a superar no tratamento é a enorme fissura que o usuário sente pela droga.

13. Em se tratando de curso e prognóstico do Transtorno de Personalidade Borderline, marque a afirmativa correta.
- A.(  ) É um transtorno instável; o paciente sofre muitas mudanças ao longo do tempo.
  - B.(  ) Estudos longitudinais mostram que existe probabilidade de progressão para esquizofrenia.
  - C.(  ) Nesse transtorno de personalidade, a farmacoterapia não é útil.
  - D.(  ) A psicoterapia é o tratamento recomendado.
14. Na avaliação do risco de suicídio, marque a alternativa cuja característica é considerada de baixo risco.
- A.(  ) Mais de 45 anos, masculino, divorciado ou viúvo, desempregado, conflituoso.
  - B.(  ) Depressão grave, psicose, abuso de substância, transtorno de personalidade grave, desesperança.
  - C.(  ) Primeira tentativa, impulsiva, desejo primário de mudança, comunicação externalizada (raiva).
  - D.(  ) Rapport pobre, isolamento social, família indiferente.
15. Marque a resposta incorreta sobre Emergências Psiquiátricas.
- A.(  ) Tratamento da agorafobia – alprazolam 0,25mg a 2mg, propranolol, antidepressivos.
  - B.(  ) Tratamento da Encefalopatia de Wernicke – uma carga de glicose e após Tiamina 100mg IV ou IM, com administração de MgSO<sub>4</sub>.
  - C.(  ) Tratamento da ideação suicida – hospitalização e antidepressivos.
  - D.(  ) Tratamento da insônia – hipnóticos apenas por um período breve; tratar o transtorno mental subjacente, regras de higiene do sono.
16. LMC, 42 anos, médica, casada, dois filhos, viajava normalmente de avião, até que, aos 23 anos, passou por uma enorme turbulência e nunca mais conseguiu viajar nesse meio de transporte. Apavora-se quando lhe sugerem uma viagem ao exterior. Ganhou uma passagem para a Europa de um laboratório e declinou da mesma, pois chegando ao avião sentiu muito medo, taquicardia profusa, tremores e ansiedade intensa. Procurou ajuda, pois começou a ter problemas com o marido em função da sua limitação. O diagnóstico correto de acordo com essa descrição é o da alternativa:
- A.(  ) Transtorno do estresse pós-traumático.
  - B.(  ) Fobia específica.
  - C.(  ) Transtorno de pânico.
  - D.(  ) Transtorno de ansiedade generalizada.
17. Entre as alternativas abaixo, qual medicamento não é indicado para o tratamento do TDAH em adulto em comorbidade com transtorno de uso de substância?
- A.(  ) Atomoxetina ou estimulantes
  - B.(  ) Bupropiona
  - C.(  ) Tricíclicos
  - D.(  ) Clonidina
18. São contraindicações absolutas de uso do Lítio, exceto a da alternativa:
- A.(  ) Insuficiência renal grave.
  - B.(  ) Bradicardia sinusal.
  - C.(  ) Arritmias ventriculares graves.
  - D.(  ) Hipotireoidismo.

19. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O Art. 5º trata dos objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, de acordo com os itens a seguir:
- I. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
  - II. Formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
  - III. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- Estão corretos somente os itens da alternativa:
- A.  I e II apenas.
  - B.  I e III apenas.
  - C.  II e III apenas
  - D.  Todos os itens estão corretos.
20. Marque a alternativa incorreta quanto aos principais objetivos da Portaria Nº 251, de 31 de janeiro de 2002, do Ministério de Saúde.
- A.  Estabelecer diretrizes e normas para a assistência hospitalar em psiquiatria.
  - B.  Reclassificar os hospitais psiquiátricos.
  - C.  Definir e estruturar a porta de entrada para as internações psiquiátricas na rede do SUS.
  - D.  Estabelecer as diretrizes e normas para a regulamentação da assistência hospitalar em pediatria no Sistema Único de Saúde - SUS.